

"INSTRUCCIONES DE USO"

Rodilon® Bloque, perteneciente a una nueva generación de rodenticidas del grupo de las hidroxibenzotripiranonas, tan eficaz en roedores susceptibles como en aquellos que expresan resistencia a otros anticoagulantes. Se requiere una sola y muy baja dosis (25 mg de i. activo/kg de peso) para eliminar roedores y presenta amplio margen de seguridad para el humano.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES: no se deje al alcance de los niños ni de los animales no objeto de control. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. Adviértase claramente de la ubicación de los puntos de cebado, utilíciense cebaderos herméticos identificados con la frase **"PELIGRO VENENO"**.

Determinense los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Utilícese para el control de roedores, la rata común o de alcantarillas (*Rattus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*), el ratón doméstico (*Mus musculus*), de la siguiente forma:

OBSERVACIONES	No. DE BLOQUES/ PUNTO DE CEBADO		GRADO DE INFESTACIÓN	PLAGA
Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 metros.	2 a 4 (equivalente a 40 a 80 g)	5 a 10 (equivalente a 100 a 200 g)	LIGERA A MODERADA	RATAS Rata de las alcantarillas Rata negra
Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado, cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.	1 a 2 (equivalente a 20 a 40 g)		SEVERA	RATONES Ratón doméstico

Inspeccionense las áreas tratadas; al tercer día repóngase el cebo consumido. Realícense tratamientos con intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfestaciones establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre reinfestación, repítase el tratamiento.

Recójase y dispóngase adecuadamente de los roedores muertos y del cebo no consumido. Para prevenir reinfestaciones elimínense en lo posible las situaciones que propicien el desarrollo de roedores como basura, agua y alimentos a su alcance, así como sitios de refugio y limítense el acceso mediante técnicas de contención física y mantenimiento de las instalaciones.

El uso de cebaderos herméticos incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. En caso de reinfestaciones continuas, colóquense cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS SITIOS TRATADOS: debido a que este producto es un rodenticida anticoagulante es posible reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES: cebo rodenticida listo para su uso y no requiere mezclarse con ningún producto. El contacto con insecticidas puede modificar el grado de aceptación o apetencia por parte de los roedores.

E75035-6g



COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Ingrediente activo:
difetialona: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4' Bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxi-1-benzoti-in-2-ona. NO MENOS DE..... 0.0025 % en peso
 (equivalente a 0.025 g de i.a./kg)
Ingredientes inertes:
 Parafina, colorante, conservador, endulcorante, saborizante artificial, harina de trigo, mijo, maíz quebrado, fécula de maíz y cacahuete molido. NO MÁS DE..... 99.9975
 Total 100.0000

RSCO-URB-RODE-516-00-07-0.0025 VIGENCIA INDETERMINADA **Contenido neto: 1 kg**

PRECAUCION

PELIGROSO. NO INHALAR. NO SE PUDE EN CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO DEBE GUARDARSE EN CASA HABITACIÓN. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE.

Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V.
 Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F., Tel. 01 (55) 57 28 30 00
 Fax: 01 (55) 52 62 90 27 y 01 (55) 52 62 95 28 Planta y almacén: Blvd. Via Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatlán, Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx., C.P. 55540, bayPremium 01 800 2283737 www.saludambiental.com.mx
 HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR: Lipha Tech Inc.
 Milwaukee, WI, 53209
 © Marca registrada por Bayer



No. de Lote:
 Fecha de elaboración:
 Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración (año.mes.día).

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO":
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

- * Utilícese equipo de protección para su aplicación: guantes de hule.
- * Evítese comer, beber o fumar durante su aplicación.
- * En caso de contacto con los ojos enjuáguese abundantemente con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión provóquese el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente, introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a criterio médico se sugiere el lavado gástrico. Consúltese al médico inmediatamente.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACION:
 manténgase al paciente abrigado y en reposo, llámese al médico. En caso de contacto con los ojos enjuáguese abundantemente con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión provóquese el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente, introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a criterio médico se sugiere el lavado gástrico. Consúltese al médico inmediatamente.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

EMERGENCIA SINTOX/AMIFAC, SERVICIO LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA SIN COSTO 01800-0092800

En caso de ingestión accidental por animales domésticos provóquese inmediatamente el vómito, lívese al animal con el Médico Veterinario y muéstrele esta etiqueta.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: la difetialona es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las hidroxibenzotripiranonas. **ANTIDOTO:** vitamina K1 (fitomenadiona). **SIGNOS Y SINTOMAS:** inapetencia, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel. **TRATAMIENTO:** adminístrese vitamina K1 como antídoto específico por vía oral, intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroxicumarina. Repítase el tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protrombina. La dosis máxima de vitamina K1 es de 40 mg al día. De ser necesario, realícese transfusión sanguínea.

Recomendaciones al Médico Veterinario: los signos en los animales intoxicados son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K1 como antídoto a la dosis de 5 a 10 mg/kg SC u oral durante 3 semanas. En casos graves se recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de compatibilidad sanguínea.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: este producto es tóxico para aves y otras formas de vida silvestre. Durante el manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Gracias por cuidar del medio ambiente utilizando responsablemente este producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.

SETIQ, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 (55) 55 99 15 88, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax: 01 (55) 55 75 08 38 y 01 (55) 55 75 08 42

GARANTIA: Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto.

Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.



LIGERAMENTE TOXICO

